

CONDYLOMES ACUMINES des voies génitales basses





CONDYLOMES ANOGENITAUX VULVAIRES : VAPORISATION LASER



TRAITEMENT des VERRUES ANO-GENITALES

IMIQUIMOD CRÈME à 5%

ETUDE OUVERTE DE PHASE III

943 PATIENTES 114 SITES 20 PAYS

	DISPARITION	REC À 6 MOIS
	53.3%	23%

HOMMES 533	44.1%	15.3%
-------------------	--------------	--------------

FEMMES 410	65.4%	32.4%
-------------------	--------------	--------------

ALDARA : BON RESULTAT






ALDARA : BON RESULTAT





ALDARA ECHEC



TRAITEMENT des VERRUES ANO-GENITALES

IMIQUIMOD CRÈME à 5%

ETUDE OUVERTE DE PHASE III

943 PATIENTES 114 SITES 20 PAYS

DISPARITION
53.3%

REC À 6 MOIS
23%

HOMMES 533

44.1%

15.3%

FEMMES 410

65.4%

32.4%

CONDYLOMES ET GROSSESSE

RISQUES OBSTETRICAUX

- **ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ**
- **RUPTURE DES MEMBRANES**
- **SURINFECTION CERVICOVAGINALE**
- **TRANSMISSION MATERNO-FOETALE**

* le vrai problème est celui de la **papillomatose laryngée juvénile** rare mais grave:

. il s'agit de petites lésions acuminées, le plus souvent laryngées, mais parfois étendues au nasopharynx et à la trachée, apparaissant avant l'âge de 5 ans et responsable de modifications du cri, de la voix, de toux et de dyspnée, avec parfois détresse respiratoire.

. la fréquence en est mal connue, comprise entre 1 p 80 à 1 p 1500 naissances de mères infectées (Shah 1986).

LÉSIONS CONDYLOMATEUSES ÉTENDUES

TRAITEMENTS OBSTETRICaux

La césarienne a-t-elle une place ?

- **Prévention de la contamination foetale mais ne met pas complètement à l'abri de ce risque : morbidité disproportionnée par rapport au faible risque foetal**
- **Indication plus reconnue : les volumineuses tumeurs condylomateuses, source d'obstacle praevia ou de risques hémorragiques..**

CONDYLOMES ACUMINÉS EXTERNES

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

- CERTITUDE DIAGNOSTIQUE
- INFORMATION et ACCOMPAGNEMENT
- ABSTENTION ? , DESINFECTION LOCALE POLYVALENTE
- ERADICATION
 - FACILE : LÉSION LIMITÉE.....destruction
 - DIFFICILE : EXTENSION.....ALDARA ®
 - DESTRUCTION LASER
 - Primaire ou secondaire
 - Anesthésie générale si lésion étendue ou multisites
- LA RECIDIVE
 - Suivi pour dépistage précoce de la récurrence
 - Pas d'acharnement thérapeutique
 - Situation améliorée en post partum

CONDYLOMES ACUMINÉS chez des enfants




Figure 1. Prise en charge des condylomes chez les femmes non enceintes





Figure 2. Management of genital warts in pregnant patients

operly.



HPV—human papillomavirus, STI—sexually transmitted infection, TCA—trichloroacetic acid.